

FIBROADENOMA JUVENIL GIGANTE BILATERAL E RECIDIVANTE: RELATO DE CASO

II Congresso Online de Ginecologia e Obstetrícia da Sogise, 1ª edição, de 25/01/2021 a 28/01/2021
ISBN dos Anais: 978-65-86861-36-5

VIEIRA; Júlia Soares¹, CARVALHO; Beatriz dos Santos², SILVA; Ícaro Bazoni da³, PASSOS⁴; Natália de Oliveira⁴, MENDONÇA⁵; Sara Calzolari⁵, FERREIRA; Carla Letícia Carius⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: O fibroadenoma é a neoplasia benigna da mama mais comum em mulheres até 35 anos. Raramente, ele se apresenta nas formas juvenil, gigante, complexa e extramamária. Para seu diagnóstico, além da clínica compatível, deve ser solicitada ultrassonografia de mamas e punção por agulha fina, de extrema importância para diagnóstico diferencial com Tumor Filoide. **OBJETIVO:** Esse relato tem como objetivo apresentar um caso de fibroadenoma juvenil gigante, que se apresentou de forma recidivante e bilateral. **DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:** Paciente, sexo feminino, branca, relata, aos 12 anos, aparecimento de nódulo em mama direita de crescimento abrupto e progressivo. Procurou auxílio médico, sendo detectada nodulação palpável em mama direita, de aspecto benigno e ultrassonografia com imagem hipoecogênica medindo 7 x 3 cm, categoria 3. Refere história familiar positiva para câncer de mama e nega uso de anticoncepcionais hormonais. Indicada a tumorectomia, com histopatológico confirmando fibroadenoma. Permaneceu em acompanhamento ultrassonográfico de rotina, com surgimento de novos nódulos, categoria 3, sem indicação de intervenção. Cerca de 2 anos após, em ultrassonografia de seguimento, foram identificados 7 nódulos sólidos em mama direita, o maior medindo 5 cm. Feita a biópsia excisional, sem intercorrências, cujo laudo histopatológico evidenciou fibroadenoma. Seguiu em acompanhamento, até que 3 anos após última intervenção, houve aparecimento de 2 nódulos em mama direita, o maior medindo 5,5 cm, e 4 nódulos em mama esquerda, o maior medindo 6 cm. Realizada nova excisão, permanecendo com diagnóstico histopatológico de fibroadenoma. Atualmente, paciente apresenta nódulos bilaterais, 2 em mama direita e 7 em mama esquerda, categoria 3, sem indicação de abordagem cirúrgica no momento, mantendo controle ultrassonográfico de rotina. **IMPACTOS DA EXPERIÊNCIA:** O fibroadenoma juvenil gigante possui uma taxa de incidência de 7-8% de todos os fibroadenomas. Podem ser encontrados bilateralmente na ordem de 10 a 15% e focos múltiplos na mesma mama, em 5 a 10% dos casos. Possui uma taxa de recorrência, a partir da excisão cirúrgica, de 33%. Portanto, a chance desses eventos acontecerem de forma simultânea em uma única paciente, como no relato, varia entre 0,01% a 0,03%, o que torna este caso singular na literatura e justifica a composição do presente trabalho. **REFLEXÕES FINAIS:** O diagnóstico de fibroadenoma não pode ser descartado mediante nódulos de crescimento rápido e dimensões extensas. O achado de nódulo palpável é fator de impacto emocional das

¹ Faculdade de Medicina de Petrópolis, juliasoaresvieira2@gmail.com

² Faculdade de Medicina de Petrópolis, bia0903@hotmail.com

³ Faculdade de Medicina de Petrópolis, icarobazoni@outlook.com

⁴ Faculdade de Medicina de Petrópolis, natopassos@outlook.com

⁵ Faculdade de Medicina de Petrópolis, sara_calzolari@hotmail.com

⁶ Faculdade de Medicina de Petrópolis, leticiacarius@yahoo.com.br

pacientes, sendo preciso abordar a questão de forma a tranquilizá-las e caso seja preciso abordagem cirúrgica preservar a arquitetura mamária, fazendo incisões mais estéticas possíveis.

PALAVRAS-CHAVE: fibroadenoma, neoplasia benigna, neoplasia da mama