

IASR - A CONSTRUÇÃO INTERPROFISSIONAL DO CUIDADO EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

23º Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 14º Congresso de Saúde Bucal Coletiva., 1ª edição, de 04/11/2020 a 06/11/2020

ISBN dos Anais: 978-65-86861-50-1

MESQUITA; FOS ¹, PADILHA; WAR ², BEZERRA; DAA ³, SILVA; AA ⁴, OLIVEIRA; ASS ⁵, ARAÚJO.; RTCA ARAÚJO. ⁶

RESUMO

Caracterização do problema: A Sífilis adquirida é uma infecção sistêmica causada pela bactéria *Treponema pallidum* que tem como principal via de transmissão às relações sexuais desprotegidas. Em 2016, autoridades de saúde reconheceram que o Brasil vive uma epidemia e, por ser patologia de fácil transmissão que afeta a saúde e a vida das pessoas, é um problema de saúde pública. Considerada como infecção sexualmente transmissível (IST), nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior e nessas fases o cirurgião-dentista (CD) pode ser o protagonista em diagnosticar lesões na cavidade oral. **Descrição da intervenção:** Trata-se de um estudo descritivo, relato de experiência dos profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a qual é referência no atendimento à população LGBT do município de Petrolina/PE. Homem transexual, 29 anos, procurou o médico, via whatsapp, por apresentar lesão em língua há 20 dias que não cicatrizava. O médico solicitou avaliação odontológica. Ao exame clínico, observou-se úlcera crateriforme com fissura central, coloração avermelhada, superfície lisa, formato oval, consistência endurecida localizada em dorso de língua. Considerou-se sífilis como hipótese diagnóstica. Os testes rápidos de HIV e sífilis foram executados baseados no cuidado humanizado e centrado na pessoa. **Resultados e perspectivas:** O teste rápido de Sífilis foi reagente e o usuário aderiu ao plano de tratamento. A terapia instituída foi uma aplicação semanal de penicilina G benzatina por três semanas consecutivas e as parcerias sexuais foram convencidas a buscar a ESF para realizar o teste rápido. Logo após a primeira aplicação, o usuário apresentou melhora significativa da lesão bucal e continua em monitoramento clínico. Portanto, o processo de trabalho proporcionou interrupção da cadeia de transmissão e conseqüentemente sequelas futuras. **Considerações finais:** O trabalho interprofissional e interdisciplinar da equipe de saúde pautado pela lógica de acolhimento e vínculo, centrado no cuidado da pessoa, possibilitou correto diagnóstico e garantiu adesão do usuário ao plano de tratamento instituído na própria ESF e, conseqüente, quebra da cadeia de transmissão. Esse caso reforça o relevante papel do CD como profissional integrante, colaborativo e responsável no diagnóstico da Sífilis.

PALAVRAS-CHAVE: sífilis, estratégia saúde da família, equipe interdisciplinar de saúde.

¹ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, fabiolaolinda@yahoo.com.br

² SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, wadson.padilha@gmail.com

³ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, danyamaro36@gmail.com

⁴ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, artur.alves.ba@gmail.com

⁵ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, ssoliveira.adriano@gmail.com

⁶ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, robertapetro@hotmail.com

¹ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, fabiolaolinda@yahoo.com.br
² SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, wadson.padiha@gmail.com
³ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, danyamaro36@gmail.com
⁴ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, artur.alves.ba@gmail.com
⁵ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, ssoliveira.adriano@gmail.com
⁶ SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA, robertapetro@hotmail.com