

ENDOMETRIOSE DE PERICÁRDIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021

ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

OLIVEIRA; Tayanni de Sousa ¹, DOMICIANO; Carolina Bandeira Domiciano ², OLIVEIRA; Deborah Cristina Nascimento de Oliveira ³, BASTO; Giovana Lins ⁴, ALMEIDA; Mariah Palitot Remigio de Carvalho Almeida ⁵, TRINDADE; Milena Guedes Trindade ⁶

RESUMO

A endometriose é uma doença crônica estrogênio dependente que acomete mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se pelo implante anômalo do endométrio, podendo ser, mais comumente, endopélvico, como por exemplo nos ovários, trompas e ligamentos uterossacro e largo, ou pode ser extrapélvico, como no diafragma, umbigo, urinário, trato gastrointestinal, pericárdio. O presente estudo tem como objetivo analisar através das evidências científicas o manejo de pacientes com endometriose pericárdica, que é uma das raras apresentações dessa doença crônica. Foi realizado através de uma revisão bibliográfica direcionada pelas bases de dados Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), UpToDate, Science Direct e Scielo, totalizando 6 artigos, dos 55 excluídos pois fugiram a temática central, estavam repetidos e ou não se enquadravam nos filtros escolhidos: Texto completo, publicações de 2010 a 2020 e estarem no idioma inglês ou português. Verificou-se que a endometriose de pericárdio é um tipo extrapélvico torácico, que também engloba quando ocorre o acometimento do implante ectópico de endométrio no diafragma e ou pleura. É um tipo extremamente raro, que em sua maioria não aparece de forma isolada, sendo mais frequente em mulheres que também apresentam endometriose endopélvica prévia. A fisiopatologia da endometriose pericárdica não é clara e provavelmente multifatorial, apresentando sintomas inespecíficos como dor torácica catamenial que pode ou não irradiar para membros superiores, hemoptise catamenial e hemotórax catamenial, que se somam a sintomas endometrióticos pélvicos como por exemplo a dor pélvica e infertilidade. Diante da suspeita de endometriose pericárdica o exame mais utilizado é a ressonância magnética cardíaca, em que nos raros casos relatados na literatura a laparoscopia para retirada dos implantes ectópicos foi o tratamento de escolha. Portanto a busca minuciosa e atenta a todos os sinais e sintomas são cruciais para indicação certa dos exames e com isso descoberta e estadiamento da endometriose torácica, e assim uma abordagem menos emergencial. Levando em consideração a sua raridade e escassos relatos bibliográficos, a descoberta e manejo da endometriose pericárdica necessita de mais atenção para um estudo mais aprofundado e assim um plano de tratamento mais esclarecido.

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose, Endometriose Pericárdica, Endometriose Torácica

¹ Faculdade Ciências Médicas da Paraíba , tayannidso@hotmail.com

² Instituto de Cirurgias Minimamente Invasivas Carolina Bandeira , carolinabdomiciano@yahoo.com.br

³ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , debmedfamene@outlook.com

⁴ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , giovanalins123@hotmail.com

⁵ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , mariahalmeida@icloud.com

⁶ Instituto de Cirurgias Minimamente Invasivas Carolina Bandeira , milenaguedes6@hotmail.com

¹ Faculdade Ciências Médicas da Paraíba , tayannidso@hotmail.com
² Instituto de Cirurgias Minimamente Invasivas Carolina Bandeira , carolinabdomiciano@yahoo.com.br
³ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , debmedfamene@outlook.com
⁴ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , giovanalins123@hotmail.com
⁵ Faculdade Nova Esperança - Famene/Facene , mariahalmeida@icloud.com
⁶ Instituto de Cirurgias Minimamente Invasivas Carolina Bandeira , milenaguedes6@hotmail.com