

PRINCIPAIS FATORES QUE AUMENTAM A PROBABILIDADE DE TROMBOSE NA GRAVIDEZ

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021

ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

MACIEL; Victoria Carneiro ¹, AMARAL; Maria Vitória Graça Couto de Campos ², LOPES; Ana Luiza Café ³, OLIVEIRA; Ana Luísa de ⁴

RESUMO

As gestantes possuem uma maior predisposição ao desenvolvimento de trombose e o presente estudo evidencia os principais fatores de risco que podem desencadeá-la, como a obesidade, uso de anticoncepcionais, idade avançada, diabetes, entre outros. O objetivo baseia-se em analisar as principais causas que aumentam a probabilidade de trombose no período gestacional. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a partir da análise de 6 artigos. Para busca destes artigos foram utilizados os descritores “ trombose na gravidez” “fatores de risco da trombose”, “gravidez”, “trombose”. Naturalmente as gestantes já possuem uma certa probabilidade a desenvolver trombose em seu período gestacional, pois durante, o corpo entra em estado de hipercoagulação para compensar o aumento considerável do tamanho uterino e das possíveis hemorragias durante o parto, além de dispor de uma maior predisposição aos fatores da tríade de Virchow, composta por elementos etiopatogênicos, como estase venosa, hipercoagulabilidade e dano vascular, que demonstram maior risco para o desenvolvimento de trombose. Vale ressaltar os principais fatores de risco para trombose na gravidez são eles: obesidade, em que há o aumento da pressão sanguínea dificultando assim a passagem do sangue; idade avançada; uso de anticoncepcionais, pela exposição exacerbada de estrogênio que pode afetar a coagulação; idade gestacional avançada; hereditariedade, mutações como do fator de V Leiden, que afeta na produção de proteína C, e deficiência hereditária de Antitrombina I; o Diabetes Mellitus que interage significativamente e diretamente no estado da hipercoagulabilidade e a falta de deambulação que é um fator favorável para a tríade de Virchow, conseqüentemente aumentando a taxa de risco.

Em síntese, foi possível notar que as mulheres grávidas possuem diversos fatores predisponentes para o desenvolvimento de trombose na gestação. Vale ainda ressaltar que essa patologia é considerada de difícil diagnóstico, tendo em vista que alguns casos podem se apresentar de maneira assintomática, logo é de extrema importância que seja feita uma anamnese detalhada e um acompanhamento frente ao obstetra.

PALAVRAS-CHAVE: fatores de risco, trombose gestacional, gravidez, trombose

¹ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Victoriacar_maciel_0901@outlook.com

² Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, mvg.amaral@gmail.com

³ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Analopesestudos@gmail.com

⁴ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, analuisa.oliveira0858@gmail.com