

## **O AUTOCONHECIMENTO DA MULHER SOBRE OS SINTOMAS DO CÂNCER DE ENDOMÉTRIO COMO SUA PRINCIPAL FORMA DE DETECÇÃO PRECOCE.**

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021  
ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

**LAURIA; Gabriel de Siqueira Mendes<sup>1</sup>, PINHO; Camila Noronha de<sup>2</sup>, ALVES; Cemille Luz<sup>3</sup>, JUNIOR; Jesiel Menezes Cordeiro<sup>4</sup>, MATOS; Clévia Dantas Luz de<sup>5</sup>**

### **RESUMO**

**Introdução:** O câncer de endométrio é um dos tumores ginecológicos mais frequentes que ocorrem no sexo feminino, principalmente, após a menopausa. Quanto mais precoce for o diagnóstico maior a chance de cura, porém, atualmente, na literatura não existe um rastreamento específico para detectar o câncer de endométrio de forma precoce. Dessa forma, o conhecimento da mulher a respeito do quadro clínico é essencial para ir em busca do profissional da saúde e com isso, realizar a investigação do seu possível diagnóstico. **Objetivo:** Destacar a importância do conhecimento da mulher acerca dos sintomas do câncer de endométrio como a principal forma de auxílio no diagnóstico precoce. **Método:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura analisando o tema proposto. Os artigos foram consultados nas bases de dados PubMed e Medline. A pesquisa foi feita pela sobreposição entre os seguintes descritores: “Diagnóstico”, “Sintomas”, “Neoplasias do Endométrio” e “Conhecimento”. Utilizou-se artigos em inglês, publicados nos anos de 2017 a 2020. Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: (A) foram excluídos os artigos que tangenciavam a temática estudada; (B) existência de duplicidade dos artigos nas seleções das bases de dados. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que abordaram a temática estudada, contendo os dados relevantes congruentes com o objetivo proposto. **Resultados:** A sintomatologia mais comum é a presença de sangramentos vaginais anormais, sendo eles caracterizados como: fora do período menstrual, mais intensos que o habitual e a presença na pós menopausa, destacando-se este último como o mais marcante, uma vez que, o maior grupo afetado por essa doença são as mulheres que já entraram na menopausa. Desse modo, recomenda-se que a maioria das mulheres que apresentam um risco aumentado para este tipo de câncer sejam aconselhadas a procurar uma assistência médica caso comecem a apresentar hemorragias vaginais anormais. Diante disso, as mulheres que devem ter uma atenção redobrada quanto ao aparecimento desses sintomas são as mulheres a partir de 45 anos, as que tiveram menopausa tardia, as nuligestas, as inférteis, diabética, hipertensas e obesas. **Conclusão:** Conclui-se, que o diagnóstico precoce do câncer de endométrio deve ser buscado com a investigação dos seus sinais e sintomas, permitindo a sua descoberta em uma fase inicial e possibilitando um tratamento com melhores resultados e possível chance curativa. De acordo com o exposto, é importante que as mulheres possuam conhecimento acerca da sintomatologia para que caso venham

<sup>1</sup> UNIFAMAZ, gabriellauria15@gmail.com

<sup>2</sup> UNIFAMAZ, pinho.camila44@gmail.com

<sup>3</sup> UNIFAMAZ, cemillepimenta@gmail.com

<sup>4</sup> UNIFAMAZ, jesieljunior17@gmail.com

<sup>5</sup> UEPA, k.d.lm@hotmail.com

a ter algo sejam capazes de procurar auxílio de um profissional da saúde para que descubram mais depressa possível a etiologia das manifestações.

**PALAVRAS-CHAVE:** Diagnóstico, Sintomas, Neoplasias do Endométrio, Conhecimento