

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DA TUBERCULOSE EM PACIENTES COM AIDS.

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021

ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

**MAGALHÃES; Laila Pereira ¹, AZEVEDO; Ana Clara Fraga de ², GARCIA; Livya Oliveira ³,
RODEIRO; Tâmara Campos Xavier ⁴**

RESUMO

A susceptibilidade do desenvolvimento da tuberculose (TB) ativa vem sendo amplamente relacionada com a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Anteriormente, a grande maioria das infecções pelo *M. tuberculosis* permaneciam latentes no hospedeiro. Porém, com a disseminação da infecção pelo HIV, os mecanismos de defesa do homem se tornaram desprimorosos, predispondo-o a progressão da infecção latente por esse patógeno. Tendo isso em vista, esse fato corrobora para a diminuição da sobrevivência de pacientes com AIDS após o desenvolvimento de TB. Este trabalho objetiva analisar os fatores de risco associados ao desenvolvimento da tuberculose em pacientes com AIDS. Diante do exposto, foi realizada uma revisão sistemática no banco de dados eletrônicos SCIELO, utilizando-se palavras-chave para capturar os artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas 5 publicações. Com base no estudo, foi observado que o aparecimento da doença tem como fator de risco uma menor imunossupressão, além do contato com indivíduos bacíferos e influência dos hábitos de vida do paciente. As baixas condições gerais de vida da população, as dificuldades de acesso a serviços de saúde, a negligência com os diagnósticos e outros problemas específicos da assistência à saúde também estão associados a elevadas taxas de infecção pelo *M. tuberculosis*. Ademais, é evidente a associação do uso de drogas com o aparecimento da TB em pacientes HIV+ devido a ampla exposição ao patógeno. Diante dessa perspectiva, é notório que pacientes com AIDS estão mais propícios ao aparecimento da tuberculose. Dessa forma, requer um alto grau de suspeição e diagnóstico laboratorial confirmatório, considerando o envolvimento de uma população de baixo nível socioeconômico.

PALAVRAS-CHAVE: AIDS, Fatores de risco, Tuberculose, Vulnerabilidade Social

¹ Faculdade Santo Agostinho, magalhaesplaila@gmail.com

² Faculdade Santo Agostinho, aninhaangico@hotmail.com

³ Faculdade Santo Agostinho, liviagarcia09@hotmail.com

⁴ Faculdade Santo Agostinho, tamycampos@hotmail.com