

OCORRÊNCIA DE PANCREATITE AGUDA BILIAR EM PACIENTES ACOMETIDOS POR LITÍASE BILIAR

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021

ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

PINHEIRO; Lara Victória ¹, SILVA; Ivamara de Moraes ², FIGUEIREDO; Tâmira Carminda Thomás de Araújo ³, CAMPELO; Vinicius Dutra ⁴

RESUMO

INTRODUÇÃO: A pancreatite aguda biliar (PAB) é uma inflamação aguda, decorrente da ativação irregular de enzimas pancreáticas. Nesse cenário, quadros inflamatórios, até complicações como a necrose pancreática ocorrem, seguidas da falência persistente do mesmo. Quanto à etiologia, notam-se fortes indícios de correlação com a litíase biliar. **OBJETIVOS:** Correlacionar a gênese da colelitíase e/ou coledocolitíase com a PAB, analisando a interferência da litíase obstrutiva do ducto pancreático (DC) e o desencadeamento da inflamação pancreática. **MÉTODOS:** Utilizando vasto levantamento bibliográfico nos bancos PUBMED e SCIELO, foram selecionados artigos de 2012 a 2020, empregando os descritores “Pancreatite aguda”, “Litíase Biliar”, “Pancreatite biliar”, em inglês e português. **RESULTADOS E DISCUSSÕES :** Com base na pesquisa realizada, a PAB destaca-se por oriunda da colelitíase, tendendo a evoluir para uma colecistite, seguida de coledocolitíase, cujo cálculo biliar emergente pode obstruir regiões como as partes distal e proximal do colédoco, atingindo ainda a papila e/ou o próprio DC. Em virtude do bloqueio do DC, o refluxo biliar não cessa, porém, o fluxo do suco pancreático é bloqueado. Ao obstruir a papila, a bile não chega ao duodeno, resultando em um refluxo dessa substância para o DC, havendo o desenvolvimento da PAB, que resulta de grave inflamação e enzimas ativas, com grave comprometimento pancreático. **CONCLUSÃO:** A PAB possui forte correlação com o surgimento de cálculos biliares, o que desencadeia uma série respostas inflamatórias e enzimáticas, resultando em graves lesões pancreáticas, salientando assim a importância de avaliar a saúde da vesícula biliar e fígado em pacientes acometidos por PAB.

PALAVRAS-CHAVE: Cálculo biliar, Inflamação pancreática, Coledocolitíase.

¹ Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, larvic56@gmail.com

² Campus Mossoró (FACENE/RN), ivamaram@yahoo.com.br

³ Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, tamirathomasmed@gmail.com

⁴ Campus Mossoró (FACENE/RN), viniciuscampelo@facenemossoro.com.br