ANÁLISE DE MORBIDADE HOSPITALAR POR DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS NAS REGIÕES DO BRASIL, 2017-2021.

Autores: Amanda Caroline Conteçotto da Silva a, Sthephane Raquel de Almeida b, Isabelle Zanqueta Carvalho c, Juliana Cristina Castro d
Rose Mari Bennermanne e. Instituições: [abce]Universidade Cesumar - UniCesumar. [dJ]Universidade Estadual de Maringá – UEM. E-mails: [a]actcontecotto@gmail.com [b]stehmestrado@gmail.com [c]
[c] isabelle.carvalho@unicesumar.edu.br [d] julianacristinacastro@gmail.com . [er]ose.bennemann@gmail.com

I CONGRESSO NACIONAL CONCIEN 2021
CIÊNCIAS DO ENVELHECIMENTO
DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE

INTRODUÇÃO

A desnutrição é um fator de risco à saúde da população idosa, podendo levar, em quadros mais graves, ao óbito (BRECH et al., 2020). Problemas como dificuldade de mastigação, deglutição, falta de dentição e perda de apetite, devem ser considerados. A desnutrição, além da falta de ingestão adequada de calorias, é também relacionada a baixa ingestão de micronutrientes e proteínas (FIDELIX; SANTANA; GOMES, 2013).

OBJETIVO

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi verificar a morbidade hospitalar de desnutrição em 60 a 80 anos por regiões do Brasil nos anos de 2017 e 2021.

MÉTODOS

Para a coleta de dados utilizou-se a base de dados do DATASUS, opção de mortalidade em informações de saúde TABNET. Selecionou-se a opção de macrorregião, a faixa etária selecionada foi faixa etária 1: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais. As sabes cientificas usadas foram a Scielo, Google Acadêmico e Science Direct. O período pesquisado foi no ano de 2017 até 2021.

RESULTADOS

O total de idosos de 60 a 80 anos e mais que apresentaram internações motivadas por desnutrição foi de 538.867,05 indivíduos. A região sudeste foi responsável por 246.844,40 dos casos totais. Em seguida aparece a região nordeste com 135.395,50 dos casos, a região sul com 97.439,66, a norte com 38.784,14 e centro-oeste com 20.403,35 de casos.

Em relação a faixa etária, dos 80 anos e mais foi a mais acometida por esta morbidade com 232.109,50 de casos, em seguida aparece a faixa de 70 a 79 anos com 174.959,13 de casos e por fim 60 a 69 anos com 131.798,42 de casos.

Observou-se com os resultados que os homens representam 293.762,32 dos casos totais, já as mulheres representam 245.104,73. Está diferença pode ser explicada pela masculinidade influenciar diretamente na vulnerabilidade às doenças (DORMANN, 2007).

CONCLUSÃO

A partir dos resultados encontrados, foi possível concluir que as internações por desnutrição em idosos é relevante, considerando que em todas as regiões do Brasil. É necessário se atentar a faixa-etária de 80 anos e mais e ao sexo masculino, tendo em vista que apresentaram maior número de internações. Sabe-se que a desnutrição é um fator de risco para a saúde. Destaca-se a inserção de alimentos ricos em micronutrientes com o intuito de promover a saúde dos idosos..

UniCesumar
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CAPES