



IMPORTÂNCIA DO ESTADIAMENTO TUMORAL EM CÃES - RELATO DE CASO

VII Semana Acadêmica Da Medicina Veterinária UCDB, 1ª edição, de 07/12/2020 a 12/12/2020

ISBN dos Anais: 978-65-86861-69-3

SILVA; Larissa Menezes da ¹, HIGINO; Danielly Huguene ², NOGUEIRA; Giovanna ³, GHIZONI; Ézio ⁴, JÚNIOR; Marlon Borges Lorenzoni ⁵, MARINI; Nathalia de Assis ⁶, MEDEIROS; Joyce ⁷

RESUMO

Neoformações em cães tem tido grande incidência nos últimos anos, com maior ocorrência em cães idosos, podendo estar relacionado a tumores malignos ou benignos, o protocolo terapêutico está relacionado diretamente com o estadiamento tumoral do pet. Entre as modalidades de tratamento estão exérese cirúrgica com ampla margem de segurança associado ou não a outras terapêuticas, como a quimioterapia, radioterapia, eletroquimioterapia entre outras. Este trabalho tem como objetivo ressaltar a importância no estadiamento tumoral e diagnóstico de neoplasia, relatado perante um atendimento no Hospital Veterinário da UCDB, de um macho da raça Maltês com 12 anos de idade, com queixa principal de acúmulo de cálculo dentário e halitose. Durante a anamnese observou-se a presença de dois nódulos, o primeiro localizado na pálpebra inferior esquerda, de aproximadamente 0,5 cm de diâmetro e evolução de 3 meses, com características não ulcerativas, pendular, e não aderido. O segundo, em face medial do membro pélvico direito, de aproximadamente 1 cm, com características ulcerativas, não aderido, alopecico e rígido. Para estadiamento tumoral foi preenchido o prontuário em ficha oncológica, solicitado exames de imagem (ultrassonografia abdominal e radiografia torácica) e o estadiamento patológico (citologia). Para avaliação pré-cirúrgica o hemograma, perfil bioquímico, eletrocardiograma e urinálise. O perfil apresentou aumento de alanina aminotransferase (194,00 UI/L) e de Leucócitos segmentados. O exame citológico apresentou a neoplasia de pálpebra compatível com processo inflamatório granulomatoso e o segundo, sugestivo de neoplasia de células epiteliais com moderado grau de malignidade. Na ultrassonografia abdominal, revelou nódulo cístico em lobo hepático médio direito, de aproximadamente 1,7 x 2,2 cm, hepatomegalia e contornos irregulares. Perante o estadiamento tumoral o proprietário foi orientado a realização de procedimento cirúrgico para a exérese da neoplasia e o estudo histopatológico. Diante do resultado deste paciente será encaminhado ao oncologista para tratamento e acompanhamento da neoplasia hepática.

PALAVRAS-CHAVE: Oncologia, exérese de nódulo, metástase.

¹ Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, larissamenezes134@outlook.com

² Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, rf4511@ucdb.br

³ Universidade Católica Dom Bosco - UCDB,

⁴ Universidade Católica Dom Bosco - UCDB,

⁵ Universidade Católica Dom Bosco - UCDB,

⁶ Universidade Católica Dom Bosco - UCDB,

⁷ Docente Universidade Católica Dom Bosco,