



## ANAIS DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E I CONGRESSO ONLINE DA SOGIA-BR

### CAUSAS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DOS CISTOS OVARIANOS EM CRIANÇAS PRÉ-PÚBERES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

XVI Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da infância e adolescência & I Congresso online da SOGIA-BR, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020  
ISBN dos Anais: 978-65-8686-1-27-3

**SILVA; Larissa Menezes <sup>1</sup>, GONÇALVES; Marcel Arthur Cavalcante <sup>2</sup>, ARAÚJO; Maria Deysiane Porto <sup>3</sup>**

#### RESUMO

**Introdução.** Os cistos ovarianos em crianças pré-púberes, em sua maioria, são assintomáticos e as manifestações clínicas decorrem de doenças e suas complicações, como cistos foliculares, adenomas, cistos serosos e teratomas. A evolução dos cistos ovarianos depende dos níveis de gonadotrofina. **Objetivos.** Identificar as principais causas dos cistos ovarianos em crianças pré-púberes. Selecionar as manifestações clínicas mais comuns de cistos ovarianos em crianças pré-púberes para detecção precoce da doença. **Métodos.** Revisão Integrativa realizada através das bases de dados MEDLINE (via PubMed) e ScienceDirect empregando a estratégia: “signs and symptoms AND ovarian cysts AND child”. Foram selecionados os artigos de pesquisas primárias publicados nos últimos cinco anos, com uso de filtros, que possuíam relação com as causas e manifestações clínicas dos cistos ovarianos em crianças pré-púberes e excluídos os que não tratavam da relação do tema, bem como revisões de literatura, teses e dissertações. **Resultados.** Foram achados 140 artigos na MEDLINE e 611 artigos no ScienceDirect. Ao final, elegeu-se oito artigos que faziam melhor alusão a proposta de revisão integrativa. As crianças pré-púberes apresentam menores níveis de gonadotrofina, resultando em menores taxas de cistos ovarianos nessa idade. Entretanto, puberdade precoce periférica ou central idiopática, síndrome de McCune Albright, doenças da tireoide e tumores ovarianos ativos estão entre as principais causas da presença de cistos ovarianos sintomáticos em crianças pré-púberes. Essas crianças podem apresentar: dor abdominal no quadrante inferior ou dor periumbilical crônica, aumento da circunferência abdominal, retenção urinária, constipação ou sensação de plenitude abdominal, dor aguda semelhante a apendicite ou peritonite, desenvolvimento precoce das mamas e sangramento vaginal. **Conclusão.** Em crianças pré-púberes os cistos ovarianos, com manifestações clínicas, ocorrem na presença de um fator desencadeante para a desregulação hormonal. O reconhecimento precoce dos profissionais de saúde dessas manifestações clínicas é um fator diferencial na conduta da doença.

**PALAVRAS-CHAVE:** Causalidade. Sinais e sintomas. Cistos ovarianos. Crianças.

<sup>1</sup> Centro Universitário CESMAC, larimenezess16@gmail.com

<sup>2</sup> Universidade Federal de Alagoas, marcel.goncalves@famed.ufal.br

<sup>3</sup> Centro Universitário CESMAC, professoradeysiane@gmail.com