



ANAIS DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E I CONGRESSO ONLINE DA SOGIA-BR

RELATO DE CASO: TERATOMA MADURO BILATERAL - ACHADO VIDEOLAPAROSCÓPICO DURANTE APENDICECTOMIA

XVI Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da infância e adolescência & I Congresso online da SOGIA-BR, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020
ISBN dos Anais: 978-65-8686-1-27-3

PEREIRA; Isabella Cruz Cesário¹, JÚNIOR; Adalberto Cesário Pereira², CRUZ; Catarina Cé Bella³, DEMÉTRIO; André Luiz Barzan⁴, NETO; Anísio de Souza⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: Teratomas ovarianos são tumores de células germinativas derivados das células primordiais do ovário, sendo o tipo mais comum de tumor ovariano em crianças. O teratoma maduro/cisto dermoide, é um tumor benigno, encapsulado, proveniente de dois ou três folhetos embrionários. O objetivo é relatar o caso de uma paciente jovem, com teratoma maduro bilateral de grandes dimensões. **RELATO DE**

CASO: GS, 13 anos, natural de Itajaí/SC, procurou pronto atendimento pediátrico por dor abdominal aguda e vômitos. Submetida à laparotomia por suspeita de apendicite aguda, evidenciou-se cisto ovariano direito com 10 cm, que foi retirado como a causa da dor e a apendicite foi confirmada e operada. Na revisão da cavidade, foi observado cisto (8cm) ovariano contralateral, que não foi abordado, por orientação da ginecologia, especialidade a qual a paciente foi encaminhada. O anatomopatológico revelou teratoma cístico maduro do ovário e apendicite aguda; RNM pélvica evidenciou grande cisto em ovário esquerdo com 325cc, paredes regulares e alguns septos. Submetida à videolaparoscopia: achado de cisto de ovário esquerdo com 8 cm, livre na cavidade, com superfície lisa e brilhante. Puncionado, apresentou líquido citrino. Realizada ooforoplastia cuidadosa, com exereses da cápsula, hemostasia e colocação de Gelfoan intraovariano. Anatomopatológico: teratoma adulto cístico. Ecografia 30 dias pós-operatório demonstrou ovário esquerdo com 29,6cc e imagem nodular compatível com tumor dermoide remanescente. Mantida conduta expectante e iniciado anticoncepcional oral combinado. Eco 4 meses após, ovário com 13cc e, 6 meses após, ovário com 11cc. **COMENTÁRIOS:** Trata-se de um caso atípico de teratoma maduro por ser uma paciente de 13 anos e ter acometimento bilateral, dimensões significativas, diagnosticado em laparotomia por apendicite na infância. Importante ser achado para evitar possíveis complicações pela evolução como a torção ovariana. A conduta de realizar ooforoplastia foi adequada considerando a idade da paciente e a não malignidade do caso.

PALAVRAS-CHAVE: Cisto Dermoide, Teratoma, Procedimentos Cirúrgicos em Ginecologia.

¹ Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, bellaccp@gmail.com

² Hospital e Maternidade Santa Luíza e Hospital Unimed Litoral - Balneário Camboriú, adalberto.9@terra.com.br

³ SC, catarinabellacruz@gmail.com

⁴ Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, andre.barzan@gmail.com

⁵ Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, anisio@anisio.med.br