



ANAIS DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E I CONGRESSO ONLINE DA SOGIA-BR

SÍNDROME DE HERLYN-WERNER-WUNDERLICH - RELATO DE CASO

XVI Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da infância e adolescência & I Congresso online da SOGIA-BR, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020
ISBN dos Anais: 978-65-8686-1-27-3

SOUZA; Ivana Fernandes ¹, GEMRA; Fábio ², SANTOS; Luisa Cascaes dos ³

RESUMO

Introdução: Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich é uma variedade rara de anomalia do ducto mülleriano caracterizada por útero didelfo, hemivagina obstruída e agenesia renal ipsilateral. O quadro clínico envolve dismenorreia, massa pélvica ou vaginal, corrimento vaginal anormal, retenção urinária aguda, podendo cursar com infertilidade, endometriose ou complicações na gravidez e parto. Múltiplas complicações associadas como estenose vaginal e formação de hematocolpos, perfuração do septo vaginal, com migração bacteriana patogênica e consequente infecção do hematocolpo podem ser encontradas. Cursa com genitália externa normal, sendo o diagnóstico realizado frequentemente na adolescência, através de exames de imagem como ultrassonografia pélvica e ressonância magnética da pelve. Análogos do GnRH, progestágeno injetável trimestral ou contracepção hormonal oral combinada contínua podem ser usadas visando a amenorreia até que o tratamento cirúrgico definitivo seja realizado. Relato de Caso: paciente de 13 anos e 10 meses, menarca aos 10 anos, ciclos menstruais regulares há 1 ano e virgem. Procurou atendimento hospitalar com dor abdominal em baixo ventre, associada à febre e deambulação dificultada. Ultrassom abdominal identificou agenesia renal esquerda, útero didelfo, hemivagina esquerda com obstrução distal e dilatação hemática no terço proximal confirmados pela ressonância magnética da pelve que suspeitou de abscesso vaginal e presença de ureter ectópico desembocando na vagina atrésica. Realizado antibioticoterapia e exérese de septo vaginal com drenagem de hematocolpos com infecção bacteriana associada. Encaminhada posteriormente para correção cirúrgica definitiva. Comentários: paciente apresentou sintomatologia habitual em casos da Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich, destacando-se o atraso no diagnóstico comum nestes casos. Enquadra-se no tipo III da classificação das anomalias do ducto de Müller e apresentou-se com complicações como hematocolpos e infecção bacteriana associada necessitando conduta hospitalar cirúrgica imediata. Destaca-se a dificuldade e importância do diagnóstico nestes casos visando minimizar complicações a curto e longo prazo às pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Ductos paramesonéfricos, vagina, útero, rim, ginecologia.

¹ Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), ivanafernandes@hotmail.com

² Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), fabio.gemra@gmail.com

³ Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), cascaesluisa@gmail.com