



ANAIS DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E I CONGRESSO ONLINE DA SOGIA-BR

SÉRIE DE CASOS: LÍQUEN ESCLEROSO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ

XVI Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da infância e adolescência & I Congresso online da SOGIA-BR, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020  
ISBN dos Anais: 978-65-8686-1-27-3

MARQUES; Amanda Damian<sup>1</sup>, FILHO; Gutemberg Leão de Almeida<sup>2</sup>, SILVEIRA; Filomena Aste<sup>3</sup>, PEREIRA; Mariana Quintela Rodrigues<sup>4</sup>, MELO; Yara Lucia Mendes Furtado de<sup>5</sup>

## RESUMO

**Introdução:** O líquen escleroso é uma doença inflamatória crônica com predileção pela região anogenital e distribuição bimodal (pré-puberdade e pós-menopausa). É caracterizado por mudança da coloração e anatomia da pele, sendo a principal via de carcinogênese vulvar. Pode regredir na adolescência. **Série de Casos: Caso 1:** Menina, 14 anos, diagnóstico de LE aos 12 anos, refere prurido vulvar desde 11 anos. **Caso 2:** Menina, 9 anos, diagnóstico aos 6 anos, mancha hipocrômica vulvar desde 2 anos. **Caso 3:** Adolescente, 17 anos, diagnóstico aos 8 anos, prurido vulvar desde 5 anos. **Caso 4:** Adolescente, 15 anos, diagnosticada aos 7 anos, referindo prurido vulvar intenso e lesões hipocrômicas simétricas por seis meses. **Caso 5:** Mulher, 20 anos, diagnóstico aos 5 anos, distribuição de manchas hipocrômicas em vulva e períneo. **Caso 6:** Mulher, 23 anos, diagnóstico aos 17 anos, com hipocromia interlabial, encarceramento de clitoris e apagamento parcial de pequenos lábios. **Caso 7:** Adolescente, 12 anos, diagnóstico aos 7 anos, com manchas hipocrômicas e pápulas pruriginosas vulvar. **Caso 8:** Mulher, 22 anos, diagnóstico aos 11 anos. Mancha hipocrômica em fúrcula e supraclitoriana, apagamento de pequenos lábios e encarceramento de clitóris. **Caso 9:** Mulher, 20 anos, diagnóstico aos 6 anos, história de prurido vulvar a anal. **Caso 10:** Adolescente, 17 anos, diagnóstico aos 17 anos, história de prurido vulvar desde 3 anos. **Caso 11:** Mulher, 20 anos, diagnóstico aos 10 anos, lesões hipocrômicas em grandes lábios e períneo. **Caso 12:** Menina, 7 anos, diagnóstico 5 anos, prurido e manchas hipocrômicas em grandes lábios há 6 meses. **Comentários:** A média de idade de início dos sintomas foi 7,33 e do diagnóstico foi 9,25. Os principais sinais e sintomas foram mancha hipocrômica e prurido. Somente uma paciente teve remissão dos sintomas após a terapia com clobetasol, considerado primeira linha de tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** criança, líquen escleroso e atrófico, terapêutica.

<sup>1</sup> UNIRIO, amanda\_damian@hotmail.com

<sup>2</sup> UFRJ, gutembergalmeldaf@gmail.com

<sup>3</sup> UFRJ, dra.filomenasilveira@gmail.com

<sup>4</sup> UNIRIO, marianaquintela@edu.unirio.br

<sup>5</sup> UFRJ, yarafurtador@gmail.com