



## VI | Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia

22 a 24  
de Julho  
de 2021

Realização:  
**SOCEGO**  
Associação Cearense de  
Ginecologia e Obstetrícia



### AVALIAÇÃO DO GRAU DE ANSIEDADE E QUALIDADE DE VIDA ESPECÍFICA EM MULHERES PRÉ-TESTE DE URODINÂMICA

VI Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, 1ª edição, de 22/07/2021 a 24/07/2021  
ISBN dos Anais: 978-65-89908-46-3

**BILHAR; Andreisa Paiva Monteiro<sup>1</sup>, CHIANCA; Thamara Ribeiro<sup>2</sup>, KARBAGE; Sara Arcanjo Lino Karbage<sup>3</sup>, AUGUSTO; Kathiane Lustosa<sup>4</sup>, SANTOS; Natália Ribeiro dos<sup>5</sup>, PAULINO; Amanda Camelo<sup>6</sup>**

#### RESUMO

**Introdução:** Incontinência urinária afeta milhões de mulheres no Brasil, podendo causar alteração importante da qualidade de vida. O estudo urodinâmico é exame invasivo realizado para avaliar os sintomas urinários. **Objetivo:** avaliar o traço relativamente estável de ansiedade (STAI-S) e o estado emocional transitório que pode ser influenciado pelo ambiente (STAI-T) antes da realização do estudo urodinâmico e comparar com questionários de qualidade de vida e com resultado da urodinâmica em mulheres com queixas urinárias. **Materias e métodos:** Estudo transversal realizado em ambulatório de urodinâmica de hospital terciário do Ceará. Foram aplicados os questionários: International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) que avalia qualidade de vida em pacientes com incontinência urinária, Overactive Bladder Questionnaire - Short Form (OAB-V8) que avalia incômodo causado pela bexiga hiperativa e a versão curta do Brazilian State-Trait Anxiety Inventory (STAI) que avalia a ansiedade pré-teste em pacientes que aguardavam para a realização do estudo urodinâmico. Logo após a paciente foi submetida ao exame e os dados do exame também foram coletados.. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico JAMOVI e Microsoft Excel 2016. **Resultados:** foram avaliadas 70 mulheres. A média do STAI-S foi de 12,3 e do STAI-T de 15,6 (varia de 6 a 24). Houve correlação positiva entre o ICIQ-SF e o OAB-V8 ( $p < 0,001$ ) e entre o OAB-V8 e a presença de contrações involuntárias do detrusor na urodinâmica ( $p = 0,02$ ). Não houve correlação entre os questionários de ansiedade e de qualidade de vida específicos para incontinência urinária. **Conclusão:** Foi observado nível médio de ansiedade em pacientes que aguardavam para realização de estudo urodinâmico, porém não houve correlação com os questionários de qualidade de vida específicos para incontinência urinária e com o resultado do estudo urodinâmico em relação a presença de perda urinária ao esforço ou contração involuntária do detrusor. Houve correlação positiva entre os questionários de incontinência urinária e a presença de contração involuntária do detrusor.

**PALAVRAS-CHAVE:** ansiedade, urodinâmico, incontinência urinária

<sup>1</sup> Universidade Federal do Ceará , andreisapaiva@yahoo.com

<sup>2</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, thamarari@hotmail.com

<sup>3</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, sara\_arcanjo@hotmail.com

<sup>4</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, kathianelustosa@gmail.com

<sup>5</sup> Universidade Federal do Ceará , nataliaribeiro.qmc@gmail.com

<sup>6</sup> Universidade Federal do Ceará , amandacpaulino@gmail.com

<sup>1</sup> Universidade Federal do Ceará , andreisapaiva@yahoo.com  
<sup>2</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, thamarari@hotmail.com  
<sup>3</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, sara\_arcanjo@hotmail.com  
<sup>4</sup> Maternidade Escola Assis Chateaubriand, kathianelustosa@gmail.com  
<sup>5</sup> Universidade Federal do Ceará , nataliaribeiro.qmc@gmail.com  
<sup>6</sup> Universidade Federal do Ceará , amandacpaulino@gmail.com