

# FATORES RELACIONADOS À SOBREVIDA DE PACIENTES COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO

XXXVII CONGRESSO CIENTÍFICO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA, 37ª edição, de 23/10/2023 a 26/10/2023  
ISBN dos Anais: 978-65-5465-062-5

MATTAR; Beatriz Alvarez <sup>1</sup>, AGULHAM; Anelyse Pulner <sup>2</sup>, JUNIOR; Carlos Roberto Naufel <sup>3</sup>

## RESUMO

**INTRODUÇÃO:** O câncer gástrico é o quinto câncer mais comum, sendo a quarta principal causa de morte na oncologia, apesar da queda de sua incidência e da melhoria nos tratamentos disponíveis. Para estimar a sobrevida de pacientes com câncer gástrico, é essencial conhecer os fatores prognósticos mais relevantes. **OBJETIVOS:** Investigar os fatores que impactam a sobrevida de pacientes com adenocarcinoma gástrico submetidos à gastrectomia. **MÉTODOS:** Estudo transversal, observacional e retrospectivo, com amostra de 82 pacientes com adenocarcinoma gástrico, submetidos a tratamento cirúrgico, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2022. Foram analisados fatores epidemiológicos e prognósticos, como idade, sexo, localização do tumor no estômago, invasão linfonodal, extensão tumoral, invasão angiolinfática, diferenciação do tumor, presença de metástase à distância, margens cirúrgicas comprometidas e tempo de sobrevida dos pacientes. **RESULTADOS:** Dos 82 pacientes, 41,5% foi a óbito no período de seguimento, sendo o período máximo de acompanhamento de 56 meses. A mediana de tempo até o óbito foi de 22,4 meses, após a realização da gastrectomia. Idade avançada (HR=2,76; IC95%: 1,23-6,19; p=0,014), localização do tumor em fundo do gástrico (HR= 2,77; IC95%: 1,17-6,53;p= 0,020) e presença de metástase à distância (HR= 2,13; IC95%: 1,04-4,36; p=0,039) apresentaram um impacto negativo significativo na sobrevida, na análise multivariada. Por outro lado, os pacientes submetidos à quimioterapia adjuvante (HR= 5,33; IC95%: 2,02-14,1; p=0,001) ou à neo-adjuvante (HR=3,36; IC95%: 1,40-8,04; p=0,006) obtiveram um impacto positivo. **CONCLUSÃO:** O presente estudo demonstrou que a sobrevida de pacientes com adenocarcinoma gástrico é influenciada negativamente por idade avançada, localização do tumor em fundo do estômago e presença de metástase à distância. Em contraste com o impacto positivo da realização de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante.

**PALAVRAS-CHAVE:** Câncer gástrico, Gastrectomia, Análise de sobrevida

<sup>1</sup> FEMPAR, beatrizamattar@gmail.com

<sup>2</sup> FEMPAR, anelyseagulham@gmail.com

<sup>3</sup> FEMPAR, carlosnaufel@hotmail.com